



Информация

# “REMEZ”

№ 157

Июнь 2025 г.


Электронный журнал  
общества любителей птиц



«Ремез»

## ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

**Иван Бевза** 5 лет назад в мае сфотографировал стоящего в воде совершенно открыто **волчка** в позе угрозы. Над ним на ветке сидела самка тювика. Таким образом волчок защищал себя от хищника. Как только ястреб улетел, волчок скрылся в зарослях. ([www.facebook](http://www.facebook))



Новый вид в орнитофауне Казахстана! В Мангистауской области 25 апреля 2025 г. была сфотографирована **желтобрюхая пеночка** (*Phylloscopus nitidus*). Фото Даниила Христинецкого.



**Маскированного сорокопута** на Караколе (г. Актау) 20 мая 2025 г. сфотографировал **Канатбек Кенжегулов**. Это четвёртая встреча вида в Казахстане.



Первая встреча и фотофиксация на сайте **европейского тювика** в Костанайской области 21 мая 2025 г. Фото **Андрея Шаталова**. ([www.kz.birding.day](http://www.kz.birding.day))





31 мая 2025 г. в дальнем углу своего участка, за забором которого небольшая речка Казачка на протяжении нескольких сот метров отделяет участки жителей бывших старинных поселений Алматы, Малой станицы и Татарки, **Александр Нелаев** заметил и сфотографировал необычную гостью - **квакву**. Появление в этом тихом уголке мегаполиса маленькой пестрой цапли вызвало у пернатых старожилов удивление и переполох. Видимо, они приняли её за неведомого хищника.

## Результаты Global Big Day



Всемирный Большой день прошел 10 мая 2025 г. Команда сайта [www.kz.birding.day](http://www.kz.birding.day) участвует в этом мероприятии уже третий год. В прошлом году было отмечено 223 вида птиц. В 2023 г. - 246 видов. В этом году Казахстан по количеству видов достиг **39 места (256 видов!)**. Лидером по количеству отмеченных видов в этом году стал **Владимир Муравский – 111 видов**. Поздравляем! Очень хороший результат. Виктория Скляренко и Геннадий Дякин - по 106 видов. Списки были поданы из 10 областей: Алматинская, Мангистауская, Атырауская, ЗКО, Жамбыльская, ВКО, Туркестанская, Костанайская, Акмолинская, СКО.

Следующее мероприятие пройдет в октябре - October Big Day—11 октября 2025 г.

**Анна Ясько** ([www.kz.birding.day](http://www.kz.birding.day))

## РАБОТА АСБК

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия проводит сбор информации о случаях нападения волков на домашних животных и людей в разных регионах страны.

Цель — изучить масштабы конфликта между дикой природой и человеком, а также разработать рекомендации по предотвращению подобных ситуаций и устойчивому управлению популяцией волков.

Если вы стали свидетелем, пострадавшим или слышали о таких случаях — примите участие в опросе и поделитесь ссылкой со знакомыми. Ссылка на опрос на казахском: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGjrJUynV22z48Xsfy8129awWyPvkqfWi2aRamH—Q-LLTg/viewform?usp=dialog> ;на русском: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmNYOLnGBxeCYhYaK3\\_Gg2Y0dNrtYbdmafAXQia6WuU9zMw/viewform?usp=header](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmNYOLnGBxeCYhYaK3_Gg2Y0dNrtYbdmafAXQia6WuU9zMw/viewform?usp=header)

Контактная информация: [alyona.koshkina@acbk.kz](mailto:alyona.koshkina@acbk.kz)

## АПРЕЛЬСКИЕ УЧЁТЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ В КАЛБИНСКОМ НАГОРЬЕ



Учёты численности птиц в Калбинском нагорье проведены нами в ясный весенний день 3 апреля 2025 г. совместно со старшим научным сотрудником областного историко-краеведческого музея С.В.Стариковым по круговому маршруту - восточнее и южнее г. Усть – Каменогорска, протяжённостью 172 км.

Местность здесь представлена придорожными и полезащитными лесополосами, травянисто-кустарниковыми степями, лугами, полями, залежами, бедлендами, приречными древесно-кустарниковыми долинами, фермами, дорогами, горами, реками, дачами и населёнными пунктами.

На маршруте встречены 19 видов птиц: огарь (7 ос.), обыкновенный гоголь (20), большой крохаль (6), чёрный коршун (4), луговой лунь (2), степной орёл (4), беркут (2), обыкновенная пустельга (2), сизый голубь (30), ушастая сова (1, труп на дороге), скворец (1), сорока (22), галка (130), грач (многочисленны), чёрная ворона (10), серая ворона (13), чернозобый дрозд (1), полевой воробей (5) и зяблик (200 ос.).

Редкие виды птиц составили 10 (52.6 %), обычные виды – 5 (26.3 %) и многочисленные виды – 4 (21.1 %). В Красную книгу Казахстана занесены сепной орёл и беркут.



Константин Прокопов, фото автора

## ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

### Юные бедвочеры Караоя наблюдают за илийской саксаульной сойкой

Посёлок Караой в Балхашском районе Алматинской области расположен близ южного побережья озера Балхаш, и отчётливо видно: здесь заканчивается асфальтированная трасса. Казалось бы, дорожный тупик для желающих посетить здешние места туристов, интересующихся этнографией и природой. Однако вот уже на протяжении нескольких десятилетий немалое количество бédвочеров (наблюдателей птиц) из разных стран, как опытных, так и любителей, ежегодно стремятся приехать сюда в мае-июне. Они продолжают двигаться по просёлочным, порой труднопроходимым, дорогам к востоку и северо-востоку от Караоя на внедорожниках, чтобы в ближних и дальних окрестностях попытаться увидеть или хотя бы услышать **илийскую саксаульную сойку** (*Podoces panderi ilensis*).



Сфотографировать или снять птицу на видео удаётся только единицам. Например, в прошлом — 2024 году среди групп зарубежных и отечественных бédвочеров, приехавших в окрестности Караоя, только опытные фотографы-анималисты — Станислав Харванчик (Словакия) и Кудайберген Амирекул (Казахстан) смогли одновременно обнаружить и снять илийскую саксаульную сойку, став тогда, пожалуй, единственными обладателями столь желанных фототрофеев.

Этот подвид — эндемик, и встречается в песчаных пустынях между реками Иле и Каратал в Южном Прибалхашье. Уникальная птица обитает в здешних пустынях круглогодично, не совершая сколь-нибудь значительных кочёвок с мест постоянного обитания. Это редчайший представитель казахстанской орнитофауны. Местные издавна называют её **жорга-торгай**, что можно перевести как «птица-иноходец». Она передвигается — преимущественно по песчаному грунту — своеобразным бегом, напоминающим иноходь лошади, хотя может и неплохо летать, но на небольшие расстояния. Илийская саксаульная сойка была открыта чуть более ста лет назад, в 1915 г. На это несколько лет и немало труда затратил доктор биологических наук Владимир Николаевич Шнитников, долгое время изучавший дикую природу региона Жетысу в XX веке.



В середине марта 2025 года старшеклассники Ануар Сердалы и Алмат Нуржазулы, проживающие в Караое, в сопровождении преподавателя выехали в близлежащую пустыню. Школьникам, проживающим по соседству с саксаульной сойкой, и в прошлом году выдалась возможность посетить эти места, но, увы, кроме её следов больше ничего увидеть тогда не удалось. На этот раз задача стояла непростая — проверить, обитает ли она ещё в ближайшей округе. По мере удаления от посёлка пейзаж перетекает в типичную песчаную пустыню, представленную невысокими слабо развевными барханами с перемежающимися понижениями, где довольно разреженно произрастают деревья саксаулов — белого (*Haloxylon persicum*) и чёрного (*Haloxylon aphyllum*) — характерные биотопы саксаульной сойки.

В начале года Ануар и Алмат, как и большинство членов подростково-юношеского



зооэко клуба, вступили в Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК), чтобы быть в мейнстриме природоведческих мероприятий и экологических акций. Ануар, Алмат, а ещё Асет Жанатулы и Магжан Оспанулы Фермебек выступали в составе команды «Panda» на прошлогоднем Almaty BirdFest и завоевали первое место в категории «новички».

Дикая природа начинается за околицей их родного посёлка. Здесь в

разные сезоны года можно встретить ушастых ежей (*Hemiechinus auritus*), зайцев-толаев (*Lepus tolai*), малых тушканчиков (*Allactaga elater*), стрелу-змею (*Psammodromus lineolatus*), нередко — ондатру (*Ondatra zibethicus*), а иногда — шакала (*Canis aureus*), чьи завывания слышатся каждый вечер с самых ближайших окраин. Жители замечают этих хищников даже днём. В этой местности часто встречаются фазаны (*Phasianus cochicus*) и другие птицы, в том числе хищные и околотовные.

Ребята ведут периодические наблюдения за ними, так как живо интересуются представителями животного мира. Этой зимой на протоке Нарын, делящей Караой на две части, зимовали три малых баклана (*Phalacrocorax pygmaeus*) и пара шилохвостей (*Anas acuta*). А Асету даже удалось увидеть на этой местами незамерзающей протоке кудрявого пеликана (*Pelecanus crispus*).

Зимовки на протоке Нарын таких видов, как шилохвость, малый баклан и кудрявый пеликан, оказались самыми северными на территории Казахстана.

Также среди зимы прямо в посёлке Ануар, один из самых активных членов зооэко клуба, сфотографировал взрослую особь орлана-белохвоста (*Haliaeetus albicilla*), включённого в Красную книгу Казахстана.



Продолжительная пешая экскурсия по пустыне прошла не зря. Всем удалось увидеть, услышать, и, более того, Алматы посчастливилось сфотографировать редкую эндемичную птицу. И теперь смело резюмируем — самый ранний сезон фотоохоты бёдвочеров за редчайшей птицей удачно начал. Впервые её сфотографировал обычный ученик, к тому же из сельской общеобразовательной школы, на любительскую фотокамеру Canon PowerShot SX30IS. Эти кадры имеют и научную ценность, так как сняты в наиболее близком к посёлку местообитании илийской саксаульной сойки и подтверждают продолжение её существования в довольно близком соседстве с человеческим поселением.

Впрочем, добытые с невероятными усилиями и трудом самые свежие изображения илийской саксаульной сойки в 2025 году — это плод мини-коллектива авторов, включая Ануара, который очень хотел её хотя бы увидеть. В походе у него в руках находилась маленькая любительская видеокамера

Sony HDR CX380 HandyCam, не позволившая оперативно снять быстро передвигающуюся илийскую саксаульную сойку. Тем не менее, на сегодняшний день эти снимки Алматы и Ануара можно считать самыми редкими анималистическими фототрофеями наших казахстанских школьников.

**Алтай Жатканбаев**

([www.acbk.kz](http://www.acbk.kz): tabigat media)

## КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РЕДКОГО ПЕРЕПЕЛА В АРИЗОНЕ

Когда говоришь с американцами о редких видах и эндемиках, им, первым делом, приходят на ум такие крупные птицы как калифорнийский кондор или американский журавль, или белоголовый орлан, которого они, почему-то, считают исключительно американским видом. Маловероятно, что за пределами Аризоны кто-нибудь в таком контексте упомянет masked bobwhite quail – бобуайт, юго-западный подвид виргинского перепела, эндемика пустыни Сонора (также известна как пустыня Хила). Основная часть этой песчано-каменистой пустыни расположена в районе американо-мексиканской границы на территории американских штатов Аризона и Калифорния, и мексиканских штатов Нижняя Калифорния и Сонора, к северу от Калифорнийского залива.

Видовое название бобуайт (bobwhite) – это чистое звукоподражание. Вначале вид считался отдельным. Все из-за окраски самцов – черная голова и каштановая грудь, совсем не то, что у их собратьев других подвидов. А вот самки выглядят неотличимыми от северных сородичей. Этот перепел, населявший типично аридные местообитания, к моменту описания вида в 1885 г. процветал. К середине прошлого века стал настолько редок, что считался исчезнувшим в природе. В начале 1960-х была замечена маленькая стая в Мексике, в 150 км к югу от границы Аризоны. Два американских энтузиаста, отловили несколько перепелов и выпустили в аналогичных местообитаниях в Аризоне. Птицы не прижились, но



в 1973 г. вид был одним из первых внесен в Закон о видах находящихся под угрозой исчезновения. Несмотря на сходство мексиканских и аризонских местообитаний вплоть до основания Национального

заповедника Буэнос Айрес (Buenos Aires National Wildlife Refuge – BANWR) в 1985 г. подходящего места для реинтродукции все таки не было. BANWR был создан специально под этот вид на площади около 50000 га путем приобретения правительством нескольких ранчо. Тогда же началась программа разведения перепелов в неволе с последующим выпуском в природу. Первые результаты программы были разочаровывающими. Ранчо страдали от перевыпаса и предотвращения природных пожаров, как компонента естественной истории региона, что, разумеется, изменило характер растительного покрова. Начав



восстановление местообитаний для перепелов, менеджеры заповедника проявили излишний энтузиазм и осуществили масштабные контролируемые палы, чем вызвали упадок туземных трав и кустарников, и быстрое распространение мескитовых деревьев и инвазийных трав. Мескит – это тоже туземное дерево, но прежде оно не доминировало в здешних ландшафтах. Теперь же под его покровом не стало достаточно густой многолетней травяной и низкой кустарниковой растительности, которые обеспечивают перепелов и пищей и кровом, и защитой от хищников. В отличие от других местных перепелов бобуайты при виде хищников замирают и прячутся в гуще растений, а не спасаются бегством.

Еще к 2015 году выжигалось до 2000 га в год. В настоящее время палы осуществляются только раз в 15-20 лет. Разработана программа восстановления утраченного растительного разнообразия. Однако этот процесс очень дорог и требует огромных усилий. Поскольку огонь не может справиться с крупными мескитовыми деревьями, их приходится выкорчевывать. У молодых деревьев ветви подрезаются так, чтобы они склонялись и росли вниз, обеспечивая хорошее укрытие для птиц. Бобуайты гнездятся много позже других перепелов, на пике июньско-июльской жары, и для успешного размножения нуждаются в муссонных дождях для охлаждения и возрождения высушенной растительности. Густая растительность поддерживает более стабильный температурный режим днем и ночью, что немаловажно для птиц при здешнем контрастном климате. Осенью, например, можно хрустеть ледком на лужах ранним утром, а к середине дня раздеться до майки. Отмечена строгая корреляция между обилием осадков и успехом размножения. Популяция сокращается, если в предшествующий год выпало менее 200 мм осадков и возрастает, если их было больше. Таким



образом, засуха является одним из главных факторов, лимитирующих выживание бобуайтов. Кроме того, они значительно более чувствительны к высоким температурам, чем перепела Гэмбела и чешуйчатый, также встречающиеся в этой части Аризоны.

У бобуайтов самцы несут основное бремя выращивания молодняка. Поэтому на первых порах в качестве суррогатных родителей для инкубаторских птенцов использовались стерилизованные самцы техасского подвида виргинского перепела. Очень заботливые родители, они справлялись с обязанностями на отлично, немало удивив всех биологов,

вовлеченных в проект. После дорастивания с родителем в вольерах, птенцы выпускались группами по десять особей под их же опекой.

Разумеется, охота на всех перепелов, а тут еще есть три вида, сразу же была запрещена. Очень уж легко в пылу охотничьего азарта спутать виды легко различимые в спокойной обстановке. Но охотники не исключены из проекта. Их собаки используются, для выработки боязни наземных хищников у инкубаторских птиц.

Заявленная цель проекта - восстановления вида в дикой природе и удаление его из Красных книг всех уровней. А для этого: создание и восстановление местообитаний в США и Мексике для четырех устойчивых популяций не менее 1000 особей каждая в течение 10 лет. Для Буэнос Айреса это означает минимум 1200 особей при плотности 1 перепел на 1,7 га. Птенцов для проекта выращивают в Пуэбла (Мексика) и Оклахоме (США). Сейчас во всех центрах разведения есть только примерно 600 птиц. Увы, несмотря на весь начальный оптимизм биологов и рейнджеров, результаты никак нельзя назвать успешными. Выживает в первый год в природе значительно менее 10% молоди, что явно недостаточно для поддержания устойчивой популяции. Поэтому, несмотря на все усилия и затраченные средства (более 20 млн долларов к первой декаде XXI в.) выпуски в природу были прекращены на неопределенное время.

На протяжении 30 лет, на моей памяти, каждый отчет или статья, посвященные этому виду, заканчиваются фразой о необходимости дальнейших исследований. Очень уж много факторов влияет на жизнеспособность популяции. Да и сами птицы-эндемики при очень ограниченной численности и обедненном генетическом разнообразии не проявляют устойчивости к воздействию этих факторов. На мой взгляд, основным недостатком проекта была концентрация всех ресурсов и усилий на периферийной части ареала, совсем не оптимальной для существования этого вида даже в далеком прошлом. Более благоприятный по природным условиям центр ареала изначально лучше подходил для реинтродукции. Но там, в Мексике, свои трудности – экономические, политические, социальные...

**Артем Полканов**, фото автора

## Стервятники спасают нас от эпидемий

Стервятников часто воспринимают как нечто неприятное — синоним падали, грязи и чего-то болезненного. В популярной культуре они окружены ореолом чего-то зловещего. Но за внешней мрачностью скрывается тонко выстроенная эко системная роль. Эти птицы не охотятся, не дерутся за еду, не спешат к туше первыми — и, тем не менее, они жизненно важны. Их выбор в пользу «мяса с выдержкой» — не извращённая прихоть, а эволюционная стратегия. И одна из самых эффективных в природе.

В отличие от хищных собратьев, вроде орлов или ястребов, стервятники не приспособлены к атаке. Их лапы не в силах удерживать сопротивляющуюся добычу, а клюв — недостаточно мощный, чтобы пробить кожу крупного животного. Вес взрослой птицы — около двух килограммов, что делает её лёгкой мишенью для конкурентов. В иерархии среди падальщиков им достаются «остатки от остатков» — но именно в этом и заключается их ниша.

Стервятники в буквальном смысле выжидают. Они парят в воздухе в поисках мертвечины, избегая столкновений с более агрессивными игроками вроде гиен и грифов. Иногда им нужно дождаться начала разложения — чтобы кожа жертвы размягчилась и стала доступной для их слабого клюва. Поэтому они часто выбирают небольших животных — грызунов, птиц, ящериц или рыбу, которую другие игнорируют. Это не каприз, а точный расчёт: чем меньше конкуренция, тем больше шансов выжить.



Главное оружие стервятника — не клюв и не когти, а его желудок. В буквальном смысле. Учёные выяснили, что уровень кислотности пищеварительного тракта этих птиц так высок, что способен уничтожать возбудителей сибирской язвы, бешенства, холеры и даже растворять дробь из свинца. Это позволяет стервятникам питаться тем, что может быть смертельно опасно для любого другого организма. Однако и здесь не всё безупречно: тяжелые металлы, особенно свинец, со временем накапливаются в теле птиц, нанося вред. Более того, некоторые вирусы и бактерии, хоть и не представляют опасности для стервятника, выживают в его кишечнике, оставаясь активными. Но даже это предусмотрено природой. Когда птица топчется по трупам, она сама дезинфицирует собственные ноги, испражняясь на них. Высокая концентрация мочевой кислоты убивает бактерии — своеобразный природный антисептик.

Если представить себе экосистему как организм, то стервятники — это его иммунная система. Они первыми вступают в контакт с потенциальными источниками эпидемий. Без них разлагающиеся тела остаются лежать неделями. Появляется больше крыс, бродячих собак, патогенов в воде и воздухе.

Резкое снижение численности стервятников в Индии в 1990-х привело к всплеску заболеваний у людей. Считается, что это стало одной из причин 48 000 смертей от бешенства между 1992 и 2006 годами. Причина — использование ветеринарного препарата диклофенака, который безвреден для коров, но смертелен для птиц. Когда скот умирал, их тела становились ядом для пернатых санитаров.

Стервятники не привлекают внимания в зоопарках, их не рисуют на эмблемах и редко ставят в центр кампаний по защите природы. Но в борьбе с эпидемиями и биоотходами они эффективнее любого человека с перчатками и дезинфектором. Без них природа просто не успевает «переварить» себя — и это быстро чувствуется на здоровье всех остальных обитателей, включая людей.

В последние годы учёные активнее привлекают внимание к важности этих птиц. В ряде стран появились так называемые «ресторанчики для стервятников» — охраняемые площадки с безопасной пищей, чтобы поддержать популяции. Однако масштабы проблем пока превышают усилия.

Роль стервятника — не отталкивающая, а жизненно необходимая. Они не выбрали «грязную» еду — они заняли вакантную нишу, которой больше никто не смог бы управлять. И пока на планете остаются миллионы живых организмов, будет оставаться необходимость в тех, кто умеет аккуратно завершать цикл. Иногда самые неприметные участники системы оказываются ключевыми. Особенно те, кто выбирает не борьбу, а терпеливое ожидание.

Cars Delgado  
(www. [ru.freepik.com](http://ru.freepik.com))

## Самая могущественная птица Южной Америки

Тропические леса Южной Америки таят в себе множество чудес, и одно из самых впечатляющих — южноамериканская гарпия, величественная хищная птица, чья мощь и грация



поражают воображение. Эта крылатая охотница парит над густыми джунглями, словно воплощение древних легенд, внушая трепет всему живому.

Южноамериканская гарпия (*Harpia harpyja*) — единственный вид своего рода в семействе ястребиных и одна из самых крупных хищных птиц планеты. Её дом — тропические леса от Мексики до Аргентины, с наибольшей численностью в Бразилии. Гарпия избегает открытых пространств, предпочитая густые

заросли, где кроны деревьев образуют надёжный зелёный купол. Она обитает в низинах, предгорьях и



даже на высотах до 2000 метров, но только там, где лес сохраняет свою первозданную плотность. На Филиппинах есть своя гарпия — Филиппинский обезьянояд, занесённый в Красную книгу и за убийство этого хищника можно отправиться за решетку на 12 лет!

Длина тела взрослой особи достигает метра, а вес может достигать до 9 кг. Размах крыльев — чуть более двух метров — кажется скромным для такой крупной птицы, но это эволюционное преимущество. Короткие крылья и длинный хвост, словно руль, позволяют гарпии мастерски маневрировать между стволами и ветвями. Её когти, длиной 10-12,5 см, сравнимы с медвежьими и способны пробивать толстую шкуру добычи. Оперение варьируется от светло-серого на голове до тёмно-сизого на спине, а широкие перья на макушке образуют «корону», которая поднимается в моменты возбуждения, усиливая грозный облик птицы. Гарпия похожа на человека, надевшего костюм птицы.

Гарпия — мастер охоты, чей рацион включает более ста видов животных. Её излюбленная добыча — ленивцы и обезьяны, такие как капуцины и ревуны, весом до 10 кг. Птица способна поднять жертву, равную или даже превосходящую её собственный вес. Охотничьи навыки гарпии опираются на исключительный слух: жёсткие лицевые перья формируют звукоулавливающий диск, позволяющий услышать шорох на десятки метров. Зрение тоже впечатляет — гарпия замечает мелкую добычу с сотен метров.



Охота требует не только силы, но и стратегии. Гарпия часто сидит неподвижно на ветке, выжидая момент для молниеносного броска. Её мощные лапы сжимают жертву с такой силой, что кости ломаются мгновенно. Эта птица не просто хищник — она вершина пищевой цепи, регулирующая численность приматов и других обитателей леса.

Семейная жизнь гарпий не менее примечательна. Эти птицы моногамны и выбирают партнёра на всю жизнь. Их гнёзда — настоящие крепости диаметром до двух метров — строятся на вершинах деревьев высотой до 50 метров. Пара использует когти, чтобы ломать ветки, создавая прочное жилище, которое служит годами. Размножение происходит раз в 2-3 года: самка откладывает одно-два яйца, но обычно выживает лишь один птенец. Инкубация длится около двух месяцев, при этом самка высидит яйца, а самец добывает пищу. Птенец растёт медленно: через месяц он начинает ходить, к пяти месяцам обрывает взрослым оперением, а полная самостоятельность наступает лишь к 3-5 годам. Родители заботятся о нём до года.

Гарпия — ключевой элемент тропической экосистемы. Однако она уязвима. Вырубка лесов лишает её гнездовых деревьев и охотничьих угодий — каждая пара нуждается в 30 квадратных километрах леса. Низкая рождаемость усугубляет проблему: потеря даже небольшой части популяции

невосполнима. Конфликты с человеком, когда гарпии нападают на домашнюю птицу или мелких животных, тоже играют роль, хотя главная угроза — утрата среды обитания. По оценкам, в мире осталось от 100 до 250 тысяч гарпий, и без мер по сохранению их число может резко сократиться.

Название «гарпия» отсылает к древнегреческим мифам о полуптицах-полуженщинах, похищавших души. Европейские учёные, впервые увидев эту птицу, нашли сходство в её устрашающем облике: совиные глаза, мощный клюв и «рога» из поднятых перьев. Эволюционно гарпия — загадка. Её предки, жившие 150 миллионов лет назад, сочетали черты рептилий и птиц, а современный вид сохранил архаичные черты, такие как чешуйчатое оперение на лапах. Эта адаптация сделала её непревзойдённым хищником тропиков, но привязала к исчезающим лесам. Сегодня гарпия — символ дикой природы, напоминающий о необходимости беречь экосистемы.



Flux ( [www.iXBT.com](http://www.iXBT.com))

## Птицы и агрессия: как жильё влияет на поведение самок

Американские учёные установили, что самки птиц, гнездящихся исключительно в дуплах деревьев, проявляют значительно более высокую агрессию по сравнению с другими видами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале *Nature Ecology & Evolution*.

Как поясняют авторы работы, такие виды птиц не способны строить гнёзда где угодно и не могут самостоятельно сделать себе полость в дереве. Поэтому уже готовое дупло становится для них крайне ценным ресурсом, за который самки готовы активно бороться. В рамках исследования учёные изучали поведение птиц из различных семейств: воробьиных, ласточковых, дроздовых, пеночковых и крапивниковых. Для каждого семейства они выбрали по два вида: облигатный, то есть гнездящийся исключительно во вторичных полостях (например, дуплах), и необлигатный, способный выбирать разные места для размножения. Эксперимент состоял в том, что рядом с гнёздами размещали чучела и динамики, воспроизводящие крики представителей соответствующего вида. Исследователи наблюдали за тем, как птицы реагируют на возможную угрозу захвата гнезда сородичами.

Результаты показали, что птицы, зависящие от дупел, проявляют значительно больше храбрости и настойчивости при защите территории. Особенно выделялись самки: они были значительно агрессивнее самцов. Учёные предполагают, что это связано с тем, что для самки потеря гнезда означает не только потерю вложенных усилий, но и серьёзный риск для будущего потомства, что делает цену утраты особенно высокой.

([www.BB.LV](http://www.BB.LV))

## Причины «разводов» в пернатом мире

Более 90 % видов птиц ведут моногамный образ жизни, однако это не всегда гарантирует стабильность в «семейных» отношениях. Как показало международное исследование, некоторые пары распадаются — и на то есть веские причины.

Учёные из Германии и Китая проанализировали данные о 186 видах птиц, сопоставив ранее опубликованные научные работы, показатели смертности и расстояния миграций. В результате они выяснили, что главными причинами «разводов» в птичьем мире являются измены со стороны самцов и длительные разлуки во время миграций. При этом, если адюльтер совершала самка, это редко становилось поводом для расставания. Наиболее склонными к смене партнёра оказались ржанки, иволги, дрозды и ласточки. В то же время самыми верными



были признаны буревестники, гуси, лебеди и альбатросы.

Исследователи также отметили, что продолжительные перелёты нередко разлучают птиц. Партнёры могут прибывать в места гнездования в разное время, и тот, кто прилетел раньше, иногда находит себе нового спутника. Кроме того, во время миграции птицы могут попросту потерять друг друга.

По мнению авторов исследования, глобальное потепление может привести к росту числа таких расставаний. Изменения климата удлиняют миграционные периоды, увеличивая вероятность разлуки и смены партнёров.

[www.Gismeteo.ru](http://www.Gismeteo.ru)

## Канадским военным запретили раздражать гусей

Минобороны Канады предупредило сотрудников своей штаб-квартиры на Карлинг-авеню в Торонто о наличии поблизости агрессивных гусей и дало рекомендации по поведению в случае встречи с ними. Ситуация с канадскими казарками в этом районе обостряется во время размножения:



после откладки яиц птицы становятся особенно агрессивны. По словам Ника Брауна из военного ведомства, вооруженным силам были разосланы инструкции, призывающие не кормить гусей.

Встретившись с агрессивной птицей, сотрудники должны оставаться спокойными и медленно отступать, при этом запрещено поворачиваться к гусю спиной. Если птица шипит или атакует, рекомендуется поднять руки, чтобы выглядеть более внушительно.

Сезон размножения приходится на март-май, в это время гуси особенно самоотверженно защищают свои гнезда. В Центре дикой природы Торонто отметили: нападения птиц на людей часто происходят из-за близости гнезд. Комплекс на Карлинг-авеню окружен зелеными зонами, где гуси могут гнездиться. Хотя точное количество гусей неизвестно, нападения могут привести к незначительным травмам или даже серьезным последствиям. Важно

помнить, что канадские казарки защищены законом, и их нельзя перемещать после откладки яиц.

[www.Gismeteo.ru](http://www.Gismeteo.ru)

## ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ



О встрече в сентябре и октябре 2024 г. в Санкт-Петербурге грачей – частичных лейцистов. Один из них с многочисленными белыми перьями на спине, груди, брюхе, боках тела, голове и крыльях. (*подробнее в статье: К.Ю.Домбровский. Грачи с отклонениями в окраске оперения// Русский орнитологический журнал 2024, т. 33, № 2476*),.

В Санкт-Петербурге 12 января 2025 г. в 2 ч ночи у станции метро при свете уличных фонарей активно пел чёрный дрозд. (*подробнее в статье: К.Ю.Домбровский. Зимнее ночное пение чёрного дрозда при искусственном освещении в Санкт-Петербурге// Русский орнитологический журнал, 2025, т. 34, № 2521*).

Массовый пролёт чёрных стрижей наблюдался 11 мая в Казани. За 30 мин над берегом Волги пролетело около 550 стрижей. Птицы летели молча в западном направлении фронтом шириной 150-200 м на высоте 15-40 м. (*подробнее в статье: В.А.Андреев. О массовом пролёте чёрного стрижа в Казани весной 2024 года// Русский орнитологический журнал, 2024, т. 33, № 2479*).

В ботаническом саду Ашхабада в 2020-2022 гг. наблюдались группы индийских кольчатых попугаев до 10 особей. В 2023-2024 гг. отмечены случаи их гнездования. Впервые этот попугай был замечен здесь в 2014 г. (*подробнее в статье: С.Аннамухаммедов, Г.Амандурдыев. Индийский кольчатый попугай в Ашхабадском ботаническом саду// Русский орнитологический журнал, 2025, т. 34, № 2528*).

Об убийстве молодым петухом серой крысы (длина тела 15-17 см), которую затем он расклевал вместе с курами. (*подробнее в статье: Д.А.Беляев, В.А.Петрова. Случай нападения домашних кур на серую крысу в Приморском крае// Русский орнитологический журнал, 2024, т. 33, № 2481*).

### **КИНЗ-ИНФОРМ**

(Калейдоскоп **интересной, необычной, забавной** информации)

Пингвин Spneb появился на свет в далёком 1988 году в зоологическом парке Birdworld, расположенном в английском графстве Суррей. Вскоре после рождения его перевезли в Paradise Park, где он живёт по сей день. Уже почти четыре десятилетия — что вдвое превышает среднюю продолжительность жизни пингвинов Гумбольдта в дикой природе (15–20 лет). Недавно Spneb отпраздновал своё 37-летие. Сотрудники парка рассказали, что именинник чувствует себя отлично и остаётся активным участником жизни колонии, которая насчитывает 24 особи. Его особенно радует наблюдать за молодыми пингвинами и, по словам зрителей, он с интересом следит за их играми. ([www.pravda.ru](http://www.pravda.ru))

Когда-то в Новой Зеландии обитал один из самых устрашающих хищников — **орёл Хааста** (*Hieraetus moorei*). Эта огромная птица весила до 18 кг, а её размах крыльев достигал почти трёх метров. Орёл получил прозвище «летающий тигр» за свою способность охотиться на моа - нелетающих птиц весом до 200 кг.

Дикая природа Новой Зеландии развивалась в полной изоляции, и до прихода людей здесь не водились крупные млекопитающие. Благодаря этому птицы заняли все возможные экологические ниши. Это яркий пример островного гигантизма, когда изолированные виды быстро увеличиваются в размерах. Эволюция до таких размеров заняла всего около 2.2 миллиона лет — удивительно быстрый темп для естественного отбора. ([www.pravda.ru](http://www.pravda.ru))

В зоопарке Филадельфии 97-летняя галапагосская черепаха по кличке Мамочка и 90-летний самец Абраццо впервые дали потомство из четырёх черепахат. Появление детёнышей чрезвычайно важно для спасения вида от вымирания. («Время», 24.04.2025)

Ученые заметили, что стрижи, которые не приземлялись в течение 10 месяцев, сбросили все свои маховые перья и отрастили новые. Тем не менее, даже те, кто иногда делал перерывы, оставались в полете 99,5% времени.

На протяжении многих поколений австралийские аборигены рассказывали истории о птицах, разжигающих костры для охоты. Долгое время считалось, что это всего лишь миф... до сих пор. Ученые подтвердили, что, по меньшей мере, три вида австралийских хищных птиц — миланский ястреб, ястреб—свистун и серый ястреб - обладают удивительным поведением: они носят зажженные ветки в клювах или когтях и бросают их в сухие места, чтобы разжечь новые пожары.



(National Geographic)

## ОТЗЫВЫ (на № 156)

Огромное спасибо! Очень яркий во всех отношениях номер. И фотографии красочные, все замечательно, как и всегда, впрочем. Успеха вам! **Юлия Разорёнова.**

Спасибо за номер "Ремеза". С удовольствием его прочёл. **Федор Карпов.**

Спасибо за очередной номер! Получил, просмотрел — интересно. Удачи издателям!  
**А.Ф.Ковшарь.**

Спасибо! Как всегда интересно и познавательно. Всего доброго, **Арт Полканов.**

Прочитываю каждый номер с большим удовольствием: и наблюдения и натуралистические рассказы! **А.Г.Резанов.**

## АНЕКДОТЫ

В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

- Природа создала множество способов передвижения: в воде, в воздухе, на земле. А вот создать колесо она не смогла.

- Почему не смогла, смогла. Просто ей для этого пришлось создать человека.

- А речка какая у нас! Вот внук у меня фотографией увлёкся, так прямо в этой речке плёнку и проявляет. Красота!

Смотрю, два голубя сидят, один другого по голове тюкает. Второй взъерошился, но молчит ...


, Муж наверное...

- Я похожа на Леди Гагу?

- На гагу точно похожа, а вот на леди не очень...

*Сразу видно, - Благодать!!!*

*И что о вкусах не спорят, тоже видать.*



---

**Внимание!** Все номера газеты «**Remez**» можно прочитать и скачать на сайте АСБК [www.acbk.kz](http://www.acbk.kz)  
Порядок доступа к электронному варианту газет «**Remez**» следующий: на Главной странице активируете «**Зона данных**», на странице Библиотека - «**Журналы**», на странице Журналы о природе – «**Газета «Общества любителей птиц «Remez».** (Надпись на выделенной зеленым полосе в нижней части страницы). Ссылка на весь список выпусков газеты: <http://www.acbk.kz/article/default/view?id=54> . На данную ссылку можно навести курсор, нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мышки. Сразу попадаете на страницу **Журналы о природе.**

**Газета «Remez» выходит с февраля 2005 года** (с № 100 и в цветном варианте)

\*\*\*\*\*

**Редакция:**

**В.В. Хроков**

(тел.373 36 60) Email: [vkh.remez@mail.ru](mailto:vkh.remez@mail.ru)

**В.Н Дворянов** (иллюстрации и дизайн)

(тел.230 42 30) [dvorianov36052@mail.ru](mailto:dvorianov36052@mail.ru)

Логотип ОЛП – Ф.Ф.Карпов

