



Информация

# “REMEZ”

№ 163 г.

Декабрь 2025г.

Электронный журнал  
общества любителей птиц




«Ремез»

**С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2026 ГОДОМ  
ДОРОГИЕ ЗНАТОКИ И ЛЮБИТЕЛИ ПТИЦ!!!**

\*\*\*\*\*

## ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

В Катон-Карагайском национальном парке (ВКО) 15 октября 2025 г. впервые был встречен и сфотографирован **каменный воробей**. Фото Владимира Воробьева.



Первая регистрация **сибирской чечевицы** (*Carpodacus roseus*) в Западном Казахстане – в Атырауской области 23 октября 2025 г. её сфотографировал Андрей Коваленко.



Две редкие встречи для Западного Казахстана – **гольцовый конёк** и **кавказский горный конёк**. Фотографии обоих видов сделаны 4 ноября 2025 г. южнее г. Актау Канатбеком Кенжегуловым.





В Акмолинской области (горы Ерейментау) 22 ноября 2025 г. в стае чечёток и урагусов отмечен **гималайский вьюрок**. Это на 700 км западнее его мест обитания. Фото **Нурума Сагалиева**. ([www.kz.birding.day](http://www.kz.birding.day))



Алматинский любитель птиц **Денис Б.** в верхней части южного мегаполиса (район Горного садовода) 27 ноября 2025 г. поймал 3 **серых снегиря**. Это кажется удивительным, так как снегيري встречаются в Алматы очень редко и только в суровые зимы. А в этом году осень очень тёплая и до конца ноября дневная температура часто стояла в пределах + 14-16 гр. На фото один из снегирей.



В Малой станице (г.Алматы), на декоративную кормовую площадку для птиц, этой осенью несколько раз прилетал **черный дрозд** частичный лейцист, с белым пятном на левой стороне головы и на шее. Фото **А. Нелаева**.

#### РАБОТА ЗООЛОГОВ

**ДРЕВНЕЕ ДИНОЗАВРОВ:** 4–12 октября в 70 км от Алматы на местонахождении Курты ученые Института зоологии РК провела результативную экспедицию и нашли более сотни скелетов амфибий палеозойской эры!

Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров! Доминирующим видом в куртинском комплексе является хвостатая амфибия утегения (*Utegenia shpinari*). Жили утегении в неглубоких пресных водоемах. Взрослые животные достигали длины 30 см и внешне напоминали современных тритонов и саламандр. У молодых особей были жабры, как у аксолотлей. За неделю удалось собрать около 120 новых скелетов, а также отпечатки древовидных хвощей – каламитов.



Местонахождение Курты было открыто в 1960-х. Однако впоследствии координаты точки были утрачены. Разрез находится посреди необъятной степи, практически лишенной ориентиров на местности, а GPS навигаторов в те годы ещё не было. В результате поиски утраченного местонахождения превратились в настоящее детективное расследование. В архивах были найдены полевые дневники участников раскопок 50-летней давности, и по скудным намекам из записей и космоснимкам точку обнаружили в 30 км к западу от одноименного поселка.

Экспедиция проведена в рамках ПЦФ BR21882199 «Кадастр диких животных аридных территорий Балхаш-Алакольского бассейна с оценкой угроз для их сохранения и устойчивого использования». Подробнее о ходе раскопок и наших находках читайте на сайте Института зоологии: <https://zool.kz/.../drevnee-dinozavrov-v-70-km-ot-almaty.../>

**Дмитрий Копылов** ([www.facebook](https://www.facebook.com/))

## ФЕНОМЕН НИЗКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ НА ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

Восточный Казахстан расположен в пределах верхней части бассейна Иртыша. В эту территорию включается Семипалатинское Прииртышье, обширные предгорья Западного Алтая, часть Центрального Алтая, Южный Алтай, Калбинское нагорье и значительная часть Казахского Мелкосопочника. Южнее лежит обширный полупустынно-степной регион Зайсанской котловины, горная система Саур-Тарбагатая и примыкающая к ней с юга Балхаш-Алакольская впадина с сухими степями и пустынями.

В административном плане региону принадлежали две административных области: Семипалатинская и Восточно-Казахстанская, объединенные чиновниками в одну Восточно-Казахстанскую область, имевшую площадь в 283 300 км<sup>2</sup>. Недавно область снова разделили на две – Абайскую (бывш. Семипалатинская) и Восточно-Казахстанскую.

Восточный Казахстан расположен на стыке крупных горных регионов Алтая и Тянь-Шаня с одной стороны и преимущественно равнинных и мелкосопочных регионов Центральной Азии (Джунгария) и Казахстана - с другой. Местность лежит в высотных пределах от 370 м над ур. м. (р. Иртыш на границе Павлодарской областью) до 4506 м над ур. м. (г. Белуха на Алтае). Наличие гор определяет высотную поясность: пустыни, степи, таежные леса гор Южной Сибири, субальпийские и альпийские луга, горные тундры. Все эти условия определяют состав фауны птиц региона.



По результатам последних ревизий (Прокопов и др., 2000; Березовиков, 2012) современная орнитофауна Восточного Казахстана представлена 411 видами (81% от числа известных в Казахстане), из них 337 видов - гнездящиеся, 52 – пролетные, 138 – зимующие, 22 – залетные. Из 56 видов птиц, занесенных в списки последнего издания Красной книги Казахстана (2010), на востоке встречается 44 вида, из них 32 вида гнездящихся.

Изученность территории Восточного Казахстана не равномерная. Хотя по многим районам имеются монографические описания фауны и крупные обзорные работы (Березовиков, 1989; 2009; Березовиков и др., 2003; Воробьев, Березовиков, 2022; Стариков, 2006; Сушкин, 1938; Щербаков, 1986).

За последние 20-30 лет состояние орнитофауны на востоке Казахстана претерпело огромные изменения - произошло катастрофическое снижение численности почти всех видов птиц. Особенно отчетливо начало безвозвратного снижения численности зафиксировано с 2006 г. С этого момента процесс шёл лавинообразно и в разной степени коснулся всех систематических групп птиц. Из 16 видов Гагарообразных, Поганкообразных, Веслоногих и Аистообразных лишь у большого баклана многократно увеличилась численность и расширилась область обитания. Остальные виды, кроме черношейной поганки снизили численность примерно на 50%. На оз. Зайсан практически исчезла прежде обычная большая выпь. Выпали из учетов кваква и колпица. Из 36 видов Гусеобразных сокращение численности не отмечено только у лебедя-кликлуна, лебедя-шипуна, горбоносого турпана и савки, которые и прежде были редкими. Остальные 32 вида снизили численность от 50 до 90%. При этом резко бросается в глаза уменьшение числа гнездящихся пар огаря. Такое же состояние видов Соколообразных – снижение численности от 40 до 90%. Почти исчезли прежде обычные все виды луней, балобан, степная и обыкновенная пустельга. Из этого отряда птиц многократно увеличилась численность только черного коршуна.



У Курообразных из 12 видов сохранилась и даже увеличилась численность только у тетерева, благодаря многократному увеличению посевов подсолнечника. Пока наблюдается и процесс дальнейшего расселения и увеличения численности фазана. На критически низком уровне сохраняется численность кеклика. Катастрофическое сокращение численности произошло у прежде обычного, местами многочисленного вида – перепела.

Из 14 видов Журавлеобразных почти исчезли прежде обычные коростель и лысуха. Остальные виды даже не встречаются в учетах. При этом, стрепет восстанавливает свой ареал на востоке Казахстана. У Ржанкообразных общее снижение численности до 60-90%. Особенно катастрофические



процессы с численностью отмечены у прежде обычных видов: малого и морского зуйков, чибиса, ходулочника, шилоклювки, черныша, перевозчика и бекаса. Осталась на прежнем уровне или не на много увеличилась численность лишь у большого кроншнепа, большого веретенника и озерной чайки. На оз. Зайсан в результате расширения гнездового ареала появились крупные колонии черноголового хохотуна и чегравы. Но все же самым невероятным в этой группе птиц остается почти полное исчезновение перевозчика. Столь же критическая ситуация наблюдается у Голубеобразных и Кукушкообразных. Здесь численность видов уменьшилась на 80-90%. На пределе существования оказались все виды горлиц и скалистый голубь. По сути, прекратился процесс расселения вяхиря и клинтуха. Лишь сизый голубь после резкого падения численности в 90-х гг прошлого века почти восстановился, потеряв, однако свою дикую форму. На 80% уменьшилась численность Сов. Особенно это заметно для филина, ушастой и болотной сов, сплюшки и домового сыча. Остальные виды и ранее были крайне редкими. На грани существования оказался обыкновенный козодой. На 50% уменьшилась численность стрижей. Среди Ракшеобразных лишь у золотистой щурки численность, возможно, сохранилась. Крайне редким видом стал прежде обычный вид – удод. По крайней мере, наполовину уменьшилась численность Дятлов и Ласточек (кроме городской ласточки). Поразителен факт крайне резкого и повсеместного сокращения численности деревенской ласточки (наряду с обыкновенным скворцом). Особенно невероятно масштабное сокращение численности наблюдается у птиц степных ландшафтов – жаворонков. На десятки километров степных маршрутов можно не встретить ни одного полевого или степного жаворонка. Численность всех видов жаворонков уменьшилась до 90-95%. Даже у черного жаворонка эта тенденция выражена на 60-70%, к тому же связанная с сокращением его ареала. Столь же значительное сокращение численности отмечается у семейства Трясогузковых. На маршрутах перестали встречаться даже такие банальные виды, как полевой конек и желтая трясогузка. Крайне редкими стали все виды Сорокопутов и Скворцов. У розовых скворцов сохранились лишь незначительные колонии. Остановился процесс расселения к северу майны.

В семействе Вороновых многократно увеличил численность только грач. Даже у такого вида, как сорока численность упала до 50%. Падение численности на 70-90% фиксируется у некоторых видов завирушек, сверчков, у всех видов камышевок, пеночек и серой мухоловки. Этот же процесс наблюдается почти у всех видов семейства Дроздовых. Показателен пример почти полного отсутствия черноголового чекана, прежде самого многочисленного вида из этого семейства. Это же характерно для южного и обыкновенного соловьев. В несколько меньшей степени заметно падение численности Синиц. Вовсе исчезли индийский и каменный воробьи. Минимальная численность наблюдается и в

семействе Вьюрковых. Крайне низка численность даже у прежде обычных видов – зяблика, обыкновенной чечевицы, седоголового и обыкновенного щеглов. В Зайсанской котловине исчез монгольский снегирь. Семейство Овсянковых – наиболее показательный пример падения численности птиц. Общеизвестен факт – катастрофическое состояние популяции дубровника. На востоке Казахстана такими примерами являются овсянки: обыкновенная, белошапочная, горная, красноухая, тростниковая, скалистая, желчная. Например, еще 30 лет назад, в течение дня без специальных поисков находили по 3-4 гнезда желчных овсянок. В настоящее время в характерных местообитаниях этого вида отмечаются 2-3 встречи в течение всего полевого сезона.

Вероятно, на процессы снижения численности влияют глобальные факторы – эпидемии орнитоза, изменения климата, а также развитие ветровой энергетики, гибель птиц на ЛЭП, на автодорогах, от применения ядохимикатов, истребление на путях миграций и множество других. На востоке Казахстана эта катастрофа проявляется сильнее еще и потому, что здесь находятся окраины ареалов многих видов птиц. Как известно, исчезновение птиц начинается с окраинных частей ареала, и свидетельствует о начале деградации орнитофауны.



С.В. Стариков, фото автора

### Всё познаётся в сравнении

Чтобы убедиться, что средняя численность популяций диких животных за последние 50 лет, действительно, сократилась на 73% , совсем не обязательно заглядывать в отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF). Зачастую, – достаточно выйти за пределы города или села и вспомнить, что было и что стало. Так, в хорошо знакомых мне на протяжении более 50 лет Талгарских дачах, и, прилегающих к западу от них полях, только за последние 5 – 10 лет исчезли или резко сократили численность многие хищные птицы, перепела, сизоворонки, шурки, сплюшки, деревенские ласточки, обыкновенные скворцы, желчные овсянки. Давно не видел, когда-то многочисленных на пролете, журавлей и больших горлинок. Намного реже, по сравнению с 70 – 80 годами, встречаются различные певчие птицы. При этом, охота в свободных угодьях у нас запрещена. Стрельба в полях и лесополосах прекратилась. Численность птицеловов, продающих на Птичьем рынке мегаполиса диких певчих птиц, вслед за изменившимся в последние годы спросом, тоже сократилась с нескольких десятков человек, в лучшем случае, до десятка. Так что в Казахстане для большинства видов птиц прямое преследование со стороны человека не является главной причиной заметного уменьшения их количества. В основном проблемы в период гнездования и кочевок, скорее всего, возникают от издержек технического прогресса.



В былые времена крестьяне мотыгами и лопатами копали магистральные и распределительные арыки для полива садов и огородов. Работа землекопа тяжелая, поэтому арыки служили многие годы. Их берега зарастали различными травами и кустарниками, которые предоставляли не только птицам, но и другим животным разнообразный корм и убежища в периоды размножения. Появление колхозов с их допотопными, по нынешним меркам, тракторами и комбайнами на биоразнообразии, а значит и на птиц если и повлияло, то в лучшую сторону. Старые арыки по-прежнему продолжали служить людям. Колхозы активно высаживали тогда вдоль дорог и полей защитные лесополосы, строили дамбы для прудов. Но в 70 – 80 годы на полях появилась более мощная техника. Чаще стали применять удобрения, пестициды и гербициды. Этот полевой научно-технический прогресс со временем только усиливался, вытесняя дикую живую природу из владений природы рукотворной. Современный трактор может за полчаса запахать старый километровый арык и мощным лемехом за 2 – 3 приёма пробороzdить в другом месте такой же новый. Ну, а какие полезные для большей производительности труда и большей прибыли химикаты начнут развеивать в скором времени над полями



многочисленные дроны, остаётся только гадать. Шум у нас поднимают, если травятся домашние пчёлы. О других отравленных насекомых, а значит, о ядовитом корме для насекомоядных птиц обычно даже не вспоминают...

Каждое лето, когда я шел в поле вдоль бетонного забора фермерского хозяйства, постоянно видел на проводах золотистых шурок. Временами к ним присоединялись сизоворонки. Три года назад все они исчезли и больше не появлялись. Толи наелись отравленных кузнечиков, толи во время зимовки на далёком юге попали в число миллионов бедолаг, отловленных китайскими паутиными сетями для кулинарных целей. У нас об этом мало кто задумывается. Даже простого сравнения, как живётся исчезающим на юго-востоке обыкновенным скворцам в других регионах Казахстана, нигде не найдёшь. Хотелось бы надеяться, что основательная статья орнитолога С.В.Старикова заинтересует всех, кто неравнодушен к проблемам и загадкам нашей природы, а помощь исчезающим птицам станет более целенаправленной. .

**В.Н. Дворянов, фото автора**

## Осенняя миграция птиц в Грузии

Мне посчастливилось второй год подряд стать свидетелем зрелищной миграции хищных птиц на побережье Черного моря: в 2024 году в качестве стажера, а в 2025 году — в качестве волонтера проекта.



Вот уже на протяжении 17 лет в окрестностях Батуми проводятся ежегодные учеты миграции хищных птиц. Уникальность этого места заключается в образовании естественного «бутылочного горлышка» между Черным морем и горным массивом Большого Кавказа. С 2008 года учеты систематически организуются некоммерческой организацией Batumi Raptor Count (BRC), ежегодно привлекая десятки международных волонтеров.

Мониторинг проводится в осенний период, обычно с 12 августа по 21 октября. Традиционно на двух станциях учитывается более миллиона пернатых хищников; исключением стал лишь 2024 год, когда было зафиксировано чуть менее 900 тысяч особей.



Систематический мониторинг миграции в регионе был заложен отечественными орнитологами. Деятельность Александра Абуладзе положила начало этому направлению, когда в 1974 году его полный осенний учет на плато Джавахети выявил пролет 177482 хищных птиц 31 вида. Эти наблюдения, вместе с данными из Абхазии, привели к проведению первого официально зарегистрированного учета в самом Батуми в 1977 году, который уже продемонстрировал внушительную миграционную активность — 445678 хищных птиц. В 1990 году команда Абуладзе установила сезонный рекорд для Восточно-Черноморского пролётного пути (664239 особей), заложив фундаментальную основу для последующего изучения Батумского «бутылочного горлышка».



Сезон 2025 года стал по-настоящему уникальным, ознаменовавшись целым рядом исторических рекордов. Миллион хищных птиц был учтен уже в первую половину сезона — 17 сентября, на экваторе миграции. Хотя обычно такое количество птиц учитывалось только в первые числа октября. 1 октября стал знаменательным днем, когда был зафиксирован самый большой однодневный пролет за всю историю учетов — почти 170000 птиц. Большая часть этого потока прошла над одной станцией, где было учтено

144740 птиц, включая 142978 канюков (*Buteo buteo vulpinus*) и более 1000 орлов. Мне посчастливилось насладиться этим невероятным зрелищем: небо было буквально заполнено стаями птиц. Окончательной победой стало то, что 19 октября впервые за все годы учетов общее число зафиксированных птиц превысило 1,5 миллиона. Всего за сезон было учтено 1506623 хищных птиц. В число наиболее

многочисленных видов вошли: обыкновенный осоед (*Pernis apivorus*) — 591916, канюк (*Buteo buteo vulpinus*) — 368159, черный коршун (*Milvus migrans*) — 363970 (что также является рекордным числом), болотный лунь (*Circus aeruginosus*) — 12012, орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*) — 7957 и малый подорлик (*Clanga pomarina*) — 5459 особей.

Вот такой невероятно успешный и рекордный сезон!

Больше информации об этом уникальном месте и впечатляющем количестве пролетающих там птиц, можно прочитать на сайте BRC (<https://www.batimiraptorcount.org/>).

Алёна Каптёнкина, фото автора

## ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

### «РУССКАЯ АМАЗОНКА» (продолжение)

"...Естественно, погода на плато время от времени преподносила сюрпризы, вмешиваясь в неотвратимо-поступательный ход весны. Пара ясных ночей с пронзительно-звездным небом выдалась очень холодной, созвездия загадочно мерцали, а температура спускалась к  $-10^{\circ}$ . Подмерзнув в палатках в первую такую ночь (увы, не было у нас тогда термобелья и полартековых флисок!), следующую мы всем скопом провели в избе, потеснив Николая. Утром он безропотно принялся за строительство дополнительных нар. Все оставленные на улице вещи задубели до звона и оттаяли только к половине десятого. Остатки влаги в ведре, мисках и кружках превратились в ледяные кругляши.


Зима вернулась 9 мая. Тяжелые низкие облака полностью придавили сопки по периметру плато. Резкий ветер принес с востока мелкий колючий снег, порой разыгрывалась настоящая метель. Сквозь завывание ветра и непрерывный шорох снега лишь изредка попискивала синица. Еле видная под снегопадом, пролетела скопа, таща в лапах пук сухой травы — очевидно, подновляет свое огромное гнездо, накануне обнаруженное нами в устье Малой Зевы. Мы проводили ее сочувственными взглядами — вряд ли хищнику удастся сегодня порыбачить. А на гнезде наверняка уже намело сугроб.

Но маршрут никто не отменял! Теплилась надежда, что чёрные журавли в такую пору будут более плотно насиживать кладку и взлетать ближе, чем обычно, демаскируя гнездо. На очередном болоте — белое безмолвие, встречный снег сечет лицо. За весь день встретили одного конька и одну пеночку. Тяжело чавкаем сапогами между побелевшими кочками, нарушая сложный желтоватый узор из торфяной жижи вперемешку со снегом. Среди набродов зайцев, глухарей и лосей видны недавние следы одинокого журавля, но и только.

Обследовали марь до восьми вечера. Едва не заблудились, лишь окончательно замерзнув и промокнув, подались назад. К этому времени с небес повалило густыми пушистыми хлопьями, начало стремительно темнеть. С заснеженных елок у реки неохотно срывались рябчики, протаявшие участки русла вновь покрылись ломким сероватым ледком. Впервые ужинали в избушке, в синих сумерках снаружи мело, на палатках и столе росли высокие белые шапки.


Зато следующим утром Юра не без удовольствия режиссировал драматичные кадры нашего с Костей выхода из полузасыпанной палатки в восьмисантиметровый слой рыхлого свежевывающего снега. Через час заметно потеплело, снег напитался влагой, с деревьев начали с шумом срываться увесистые гирлянды кухты. Под крышей избушки в ряд выстроились сосульки, слегка подсвеченные большим красноватым солнцем, еле проглядывающим сквозь пелену туч. Часа через три громоздящиеся вокруг влажные сугробы стали ощутимо оседать, зазвенела капель, но во второй половине дня небеса снова прорвались снегопадом.

Непогода испытывала нас несколько дней, мокрый снег переходил в ледяной дождь и обратно. Иногда хмарь угрожающей плотной пеленой сползала с северных сопки, заполняя нашу котловину туманом и моросью так, что почти невозможно было высушить одежду, а залезание в отсыревшую



палатку становилось сущим мучением. Чтобы не простыть (эх, по стопочке бы порой не мешало!), натирались «бальзамом» — топленным барсучьим жиром, захваченным Николаем. Из гибкой лозы и обрывков рыбацкой сети Николай соорудил на пробу нечто вроде снегоступов, но крепить их на резиновые сапоги оказалось морокой, и идею пришлось похоронить».


«...Возле лесопилки под сопкой, в верхнем конце поселка, в сумерках и ночью все не стихают многоголосые хоралы земноводных. Из луж и рытвин между штабелями бревен доносится утробное кваканье чернопятнистых лягушек, высокие дрожащие трели монгольских жаб, металлически-крякающее стаккато дальневосточных квакш. Бурые дальневосточные лягушки молчат — эти свое уже отпели.



Квакши, еще не переселившиеся из водоемов на стебли и листья, пока не приобрели салатную окраску и демонстрируют самые разнообразные наряды — от голубовато-аметистового до бледно-оливкового и молочно-кофейного с коричневыми глазками. В лучах фонарика на мелководьях влажно поблескивают их горловые мешки медового цвета, ритмично вздувающиеся и опадающие в унисон с оглушительными криками. Но стоит сделать резкое движение — квакши замолкают и камешками булькают на дно. В несколько раз превосходящие квакш размерами чернопятнистые лягушки с бессмысленными светлыми глазами и дымчатыми пузырями по углам рта, выглядят словно наспех сделанные надувные резиновые игрушки, разбросанные среди мусора на поверхности воды.»

«...В конце весны особый шарм Капкану придавали многочисленные бабочки. Разнообразные ванессы, желтушки и голубянки. Золотисто-рыжие перламутровки с тонким черным узором. Буроватые со светлыми точками и линиями пеструшки — дубовая и Радде. Японские траурницы с голубыми перевязями. Крупные синие с белыми просветами радужницы, или переливницы Шренка, с очень эффектным, красивее верха, узорчатым исподом широких крыльев.

Больше других нас радовали представители семейства парусников. Здесь были скромные, с полупрозрачными крылышками аполлоны Штубендорфа, похожие на европейскую мнемозину. Угловато-хвостатые махаоны цвета слоновой кости и их близкие родичи — ксуты в черно-бежевую полоску. Наконец, хвостоносцы Маака — большие, темно-сине-зеленые с искрой, длинными каплевидными хвостиками и малиново-кобальтовыми глазками по волнистому краю задних крылышек. Просто привет из тропиков Азии! Мы регулярно заставляли в Капкане массовый лет весенней генерации этого символа Дальнего Востока. Мааки порой десятками заполняли воздух и образовывали постоянно меняющую цвет и конфигурацию траурную кайму вокруг каждой лужи,



эффективно отжимая источник влаги у столь же многочисленных боярышниц. Взлетающие боярышницы устраивали метель из белых хлопьев, но пробиться сквозь заслон парусников не могли.

Очень хотел посмотреть лёт этих поистине королевских бабочек Алексей, но именно в тот сезон, когда он присоединился к нашему отряду, весеннего лета вдруг не случилось! После нескольких вылазок в Капкан в самое подходящее для Мааков время Алексей заподозрил какой-то подвох, патетически обвинил нас в обмане бикинских новичков и даже громогласно усомнился в реальности существования легендарного чешуекрылого. Нам с Костей оставалось только пожимать плечами. Пару-тройку порхающих одиночек потом ему все-таки предъявили, и тем не менее разочарованию коллеги не было предела! Оттаял он, лишь когда в разгар лета на свет нашего костра прилетела шикарная артемида с размахом крыльев почти в ладонь — свеженькая, необтрепанная, видимо только что из куколки. Ну а выхода из куколок позднелетнего поколения парусников Маака и ксутов — особой куда более крупных и темных (но менее ярких и красивых!) — я редко когда дожидался, покидая Бикин раньше наступления августа».

**Евгений Коблик**, рис. автора

(«В верховьях "русской Амазонки"». АНФ, 2025)(www.facebook.com)

## Центральный Вьетнам – 2025

В этот летний отпуск решили с семьей поехать во Вьетнам. В южной части Вьетнама мы уже отдыхали раньше, а совсем недавно запустили прямые авиарейсы из Алматы в Дананг, который в центральной части страны, так что теперь решили туда. В отпуске нужно отдыхать, а не забивать голову вопросами логистики, поэтому купили как обычно пакетный тур. Жили в отеле Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas. Так как был с семьей, то отдых в основном классический - курортный, а для бедвотчинга вырывался в основном на пару утренних часов, примерно с 6 до 8 ч. Так что большей частью бродил в непосредственной близости от отеля.

На территории непосредственно отеля самыми обычными видами птиц были златогузый бюльбюль, полевой воробей и обыкновенная майна. Изредка видел длиннохвостого сорокопуга, зебровую горлицу, красноголовую портниху. В небе часто летали саланганы-водорослееды, реже синехвостые щурки. Непосредственно на морском берегу не видел никаких птиц. Рядом с отелем жилые дома, а за ними незастроенные пространства, которые я сначала воспринял как пустырь, но на проверку это фактически кладбище. Здесь добавились такие птицы как домовый воробей, сизый голубь, китайская горлица, серошекий бюльбюль, украшенный чибис, масковая кустарница, ракетохвостая сорока, рисовый конек и мой первый лайфер – желтобрюхий воробей. Его идентифицировал уже потом по фото. Еще из-под ног вылетел козодой, но не рассмотрел какой.

Дальше начинаются рисовые поля и пруды, очевидно, рыбоводные. На полях меня поразило большое количество волчков, большей частью китайских, но встречались и рыжие (мой 2-й лайфер). А вот из других цапель только одиночная малая белая. И все! Еще была одна зеленая, но не на полях, а на берегу реки. Из мелочи самые массовые - золотистые цистиколы и буроголовые принии. Встречались и желтобрюхие принии (3-й лайфер), за них я сначала принимал всех приний, у которых есть желтое на брюхе, но потом по фото некоторые такие были переопределены в буроголовых. Другие встреченные на полях виды птиц: длиннохвостый и бирманский сорокопуги, чубатая майна, короткохвостая горлица, чешуйчатая и черноголовая мунии, султанка, большой кукал, плачущая кукушка, изумрудная щурка, обыкновенный и красноносый зимородки, черный дронго, черношейный скворец. Пролетали небольшие группы пестроносых крякв и свистящих уток. На прудах малые поганки, летала пара крачек. Удалось снять одного серого погоньша. Буквально за пару недель до этого Санжар неоднократно видел в этих местах Slaty-breasted Rail, которого я очень хотел, но мне за 4 прогулки они так и не встретились. При экскурсии к статуе «Леди Будда» я очень надеялся там и птиц посмотреть, особенно хотелось крючоклювого голубя и зеленоухого бородастика, которых там часто отмечают бедвотчеры. Но, к сожалению, этих птиц так и не увидел, хотя нашел плодовые деревья, на которых их обычно фотографируют. Да и других птиц там видел совсем мало – пестрогорлые бюльбюли, ракетохвостые сороки, полевые воробьи - вот и все.

Даже когда едем на пляжный отдых, я стараюсь пару дней выделить для поездки в интересные по птицам места. В этот раз таким местом выбрал национальный парк Bach Ma. Заранее нашел и заказал профессионального бединг-гида. Рано утром он забрал нас с женой из отеля и в 6.00 были уже у въезда в нацпарк.



Основной ландшафт нацпарка – горный тропический лес, так что передвигаться возможно только по дорогам. Не повезло с погодой – в северной части Вьетнама был тайфун, отголоски его дошли и досюда, дождя не было, но из-за ветра птицы малоактивны. В результате за целый день я увидел всего 19 видов птиц, а сфотографировал только 9. Правда, из них 4 были лайферами – Necklaced Barbet, индокитайская птерутия, индокитайская юхина и Short-tailed Scimitar-Babbler. Из интересного еще стоит упомянуть красноголового трогона и желтобрюхую циссу. На самом деле птиц было гораздо больше, гид периодически называл, чьи голоса он слышит, но мне- то хотелось увидеть, а лучше сфотографировать. Переночевали в гостевом домике здесь же в нацпарке. На следующий день погода не изменилась, птиц встречалось мало. Из интересных - серебряный фазан, желтогрудая тимелия, серощекая очковая пеночка. Особенно досадно получилось с сойковыми сороками. Гид издалека услышал их голоса, включил звук, они стали приближаться, подлетели уже к ближайшему к нам дереву, но все время были закрыты, так что я не увидел их даже мельком. Когда выехали из Bach Ma, гид спросил, хочу ли я увидеть масковую кустарницу. Конечно, хотел. Свернув с дороги, заехали на



какое-то кладбище, вскоре услышали гомон кустарниц. Гид включил звук. Кустарницы подлетели чуть ближе, их уже стало видно, удалось и сфотографировать. Но еще ближе так и не подлетели. Это был тоже для меня лайфер.

На обратном пути заглянули еще на пустынный пляж. Из новых для этой поездки птиц тут были малые крачки и малайские щурки. А главное - гид вдалеке на берегу разглядел белолицего зуйка (лайфер). Я сделал контрольные снимки и пошел в том направлении, надеясь снять поближе. Но когда приблизился, зуйка там уже не было. Странно, не видел, что бы он улетал, а убежать же сильно далеко не мог. Вот птицы часто имеют такое свойство, просто исчезать, как будто способны перемещаться в другое измерение. На этом бединг закончился. По дороге остановились только покушать в рыбацкой деревне, в кафе.

В итоге, за всю поездку в центральный Вьетнам я увидел 70 видов птиц, из них сфотографировал 60, в том числе 9 стали лайферами. Конечно, не много. Но это, все-таки, моя 6-я поездка в Юго-Восточную Азию, причем вторая во Вьетнам, так что с лайферами с каждым разом все труднее. Общий список сфотографированных мной в мире птиц - 1385 видов. Списки птиц из этой поездки здесь: <https://ebird.org/tripreport/414942?view=checklists> .

**Геннадий Дякин**, фото автора  
([www.kz.birding.day](http://www.kz.birding.day))

## О ВОРОБЬИНОЙ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ

В “Remez” №159 рассказывалось о сообразительных новозеландских воробьях, научившихся



открывать автоматические раздвижные двери супермаркета. Такое поведение мне довелось впервые наблюдать лет 15 назад в одном из небольших региональных аэропортов. Таким образом птицы проникали в кафе внутри терминала. Вообще птицы и, в частности воробьи, в помещениях – это существенная проблема в Новой Зеландии, стране птиц, с ее традиционно дружелюбным отношением к пернатым. Большей частью, это просто досадные неприятности от постоянно причиняемого мелкого беспокойства и назойливого попрошайничества, но, нередко, это нечто более значимое. Наверное, наиболее распространены случаи срабатывания сигнализации систем безопасности, активированных птицами внутри строений. Затем идет загрязнение фекалиями.


Если на заводах рабочие относятся к этому вполне терпимо, иногда даже размещая в цехах юморные предупредительные знаки типа «Осторожно, зона воздушной бомбардировки!», то в пищевой промышленности это уже риск загрязнения продуктов. А это чревато, потому и отношение другое.

Но, вернемся к нашим воробьям. Несколько лет назад менеджер супермаркета «New World» в Окленде попросил меня заняться воробьиной темой. Именно здесь выполнялись продуктовые заказы сотрудников Департамента охраны природы с островов залива Хаураки, в том числе, и рейнджеров из моей команды. Воробьи повадились проникать вместе с первыми покупателями в 07:00, а вскоре, если покупатели запаздывали, научились активировать датчики дверей. Внутри они просто бесчинствовали, совершая наглые налеты на мясной, хлебный и молочный отделы, где легко проклевывали прозрачную пластиковую упаковочную пленку. Лакомились фаршем, и мягкими (самыми дорогими!) сырами. Сладкие плоды - киви, хурма, бананы, половинки дынь - тоже не оставались без птичьего внимания. С черного хода воробьи проникнуть не могли. Там на всех дверях повесили заграждения - ленты из плотного пластика. Проблему следовало решать в торговом зале.

Первая идея – отловить самых сообразительных на входе сетью-паутинкой – не сработала. Воробьи распознавали сеть и разворачивались в полете. Они ее прекрасно видели даже если им в глаза бил встречный свет специально установленного мною софита и предпочитали дожидаться покупателей. Оставалось пробовать изначально летальные методы – отстрел и ловушку типа масштабированной крысоловки-давилки с увеличенной рамкой и сеткой на ней. Приманка – крошки и нарезанные сладкие фрукты. Моя пневматическая винтовка калибра 5,6 мм с регулируемой начальной скоростью пули позволяет надежно добыть птицу, сидящую перед окном, стеклянным шкафом или плафоном светильника, без всяких повреждений оборудованию. Оптический прицел-зум практически исключает промахи. Кстати, на такую винтовку требуется разрешение как на огнестрельное оружие. При максимальной мощности кролика или поссума, например, можно добыть на дистанции до 50 м. Маленькая хитрость – пульки лучше брать с плоской (не острой!) вершиной. Они самые точные и менее всего подвержены рикошету.

А еще новозеландские воробьи умеют считать. По крайней мере те, что кормятся в нашем саду. Несколько лет назад я начал зимой подкармливать сереброглазок (*Zosterops lateralis*) - симпатичных маленьких зелено-желто-коричневых созданий размером до 12 см и весом до 13 г. Не то, чтобы это было действительно надо. Климат и окружающая растительность позволяют им безбедно существовать на широтах всей страны, протянувшейся на 2000 км с севера на юг. Просто, мне очень нравится слышать их мелодичный посвист и наблюдать стремительный полет, аэробатические этюды и зависания вниз головой на цветах и плодах. Быстро выяснилось, что птичек устраивает меню из сладких бананов, апельсинов и киви, нарезанных колечками и нанизанных на самые тонкие гибкие веточки камелии. Это чтобы грязнуль дроздов не приваживать. Им я тоже всегда рад, тем более, что они спасают сад от прожорливых улиток. Но очень уж охотно и обильно они гадят всегда и везде. Дрозды, воробьи и туи (из сем. медоедов), конечно же моментально обнаружили вкусняшки. Если опрятным мелодичным утренним будильникам туи я всегда рад, то дрозды и воробьи на цветущих камелиях не приветствуются. Последние – из-за их количества и галдежа. Сотни их проживают в больших деревьях неподалеку.

Стаи воробьев я стал активно гонять из сада, но с парой-другой готов был мириться. В таком количестве они не могут доминировать и прогнать стайку из 6-10 моих любимцев. Иначе пол дня у меня уходило бы только на войну с воробьями. Очень скоро воробьи поняли, что пара не вызывает моего гнева и стали появляться именно в таком количестве. При этом они не созывают, как обычно, всех товарищей радостным чириканьем, а наедаются втихую. Затем они попытались увеличить присутствие, но быстро осознали, что за этим следуют «санкции». Теперь, пока одна пара кормится вместе с сереброглазками, вторая ждет неподалеку на заборе или ТВ антенне. Порой, вторая пара является в «столовую» со своей едой и демонстративно на земле расклевывает кусочек хлеба, принесенный откуда-то со стороны, словно говоря: «Смотри, мы не отнимаем у маленьких». Еще не понял, у меня столуются одни и те же две пары, или они сменяются другими из большой окрестной



стаи. Отлавливать для мечения не хочется, чтобы не пугать других садовых птиц. На ум приходит дистанционно управляемый пульверизатор с краской. Осталось придумать как реализовать эту задумку. Любые идеи принимаются с благодарностью.

Артем Полканов, фото автора

## Опасность на высоте

Летучие мыши начали ловить и поедать птиц прямо в воздухе. Учёные раскрыли секрет охоты большого ночного кожана — самой крупной летучей мыши Европы. Эти хищники ловят мелких птиц в полной темноте на высоте более километра и пожирают добычу прямо в полёте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ежегодно миллиарды певчих птиц совершают сезонные миграции между местами гнездования и зимовки. Многие летят на большой высоте в ночное время, избегая встречи с дневными хищниками — ястребами и соколами. Однако ночь не гарантирует безопасности: в темноте на них охотятся летучие мыши.



Биологи оснастили несколько летучих мышей миниатюрными датчиками, разработанными в Орхусском университете (Дания). Приборы фиксировали траекторию движения, скорость, высоту полёта и издаваемые звуки. Эти данные впервые позволили детально изучить, как летучие мыши атакуют птиц на километровых высотах в кромешной тьме.

Они используют эхолокацию — испускают мощные ультразвуковые сигналы и улавливают отражённое эхо. В отличие от некоторых насекомых, птицы не воспринимают эти частоты и обнаруживают опасность лишь за мгновение до атаки. Шансов на спасение практически нет.

Записи зафиксировали поразительную картину: летучие мыши преследуют добычу, пикируя почти вертикально вниз на огромной скорости — подобно истребителям в воздушном бою. Микрофон записал 21 отчаянный крик пойманной малиновки, а затем звуки поедания добычи на низкой высоте.

([www.news.1777.ru](http://www.news.1777.ru))

## Мясо воробьев предлагают в ресторанах Узбекистана

В Узбекистане обсуждают необычный кулинарный тренд — блюда из воробьев. В одном из заведений Бухарской области блогер снял ролик о «деликатесе» и показал, как готовят воробьиный суп и шашлык. В соцсетях это вызвало волну обсуждений: одни уверены, что такие блюда полезны, другие называют это лишь хитрым маркетингом.



С 15 августа в стране разрешили добывать некоторых птиц, включая голубей и воробьев. Но только по лицензии и в ограниченных объемах. Массовое истребление ради ресторанных меню правила не оправдывают.

В последнее время участились случаи употребления мяса воробьев в качестве пищи в различных регионах Узбекистана: в Ферганской, Ташкентской и Бухарской областях. К сожалению, территориальные управления

Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан не проявляют должной реакции на данную проблему

Следует особо отметить, что в ряде ресторанов и кафе мясо воробья подаётся с утверждениями, якобы оно «повышает иммунитет» или «благоприятно влияет на мужское здоровье». Эти заявления не имеют научного обоснования и вводят в заблуждение население.

В связи с этим, мы призываем граждан не доверять недостоверной информации, не подтверждённой Министерством здравоохранения Узбекистана. Незаконная охота на диких птиц и их употребление в пищу может нанести вред экологическому балансу. При этом экологи бьют тревогу и напоминают, что воробьи — важная часть экосистемы. Они регулируют численность насекомых и помогают поддерживать природный баланс.

Интересно, что в Узбекистане это не какая-то давняя традиция. Судя по всему, это современное явление, связанное с ресторанным бизнесом и кулинарным хайпом. Мясо воробьев подают как «деликатес» и приписывают ему мифические полезные свойства.

Асет Смагулов ([www.kz.kursiv.media](http://www.kz.kursiv.media))

## ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ

У Ладожского озера пара чеглоков усыновила двух птенцов из соседнего (в 1 км) гнезда чеглоков, после исчезновения их родителей. (*подробнее в статье: Е.В. Михалева. Случай вероятного усыновления у чеглока// Русский орнитологический журнал, 1997, № 10*).

Залёт чёрного жаворонка в Красноярский край – самец был встречен 7 апреля 2018 г. в районе деревни Минино Емельяновского р-на. (*подробнее в статье: Н.О. Яблоков. Первая встреча чёрного жаворонка в Красноярском крае// Русский орнитологический журнал, 2025, т. 34, № 2558*).

Встречи хромистов: грача, озёрной чайки и большого баклана. Хромисты – птицы, окрашенные в жёлтый или палевый цвет, у которых в оперении чёрный меланин не вырабатывается, и птицы выглядят рыжеватыми. (*подробнее в статье: Ю.В. Лохман, А.А. Гожко. Встречи птиц-хромистов в Краснодарском крае (грач, озёрная чайка, большой баклан)// Байкальский зоологический журнал № 2 (39), 2025*).

В сквере г. Волгограда длительное время с декабря 2023 г. до октября 2024 г. периодически видели абсолютно белого воробья. Клюв и лапы были светло-жёлтые, глаза тёмные. Поведение этой особи не отличалось от поведения нормально окрашенных сородичей. (*подробнее в статье: Е.Л. Лыков, Ю.В. Агафонов. Встречи aberrативного белого домового воробья в Волгограде// Русский орнитологический журнал, 2025, т. 34, № 2554*).

## КИНЗ-ИНФОРМ

(Калейдоскоп интересной, необычной, забавной информации)

Тонкоклювый кроншнеп — птица с длинным изящным клювом и мелодичным, чуть тревожным свистом — официально исчез. Международный союз охраны природы признал вид вымершим. Это первое зафиксированное глобальное вымирание птиц в континентальной Европе, Северной Африке и Западной Азии. Когда-то кроншнеп был обычным странником. Он гнезился в Центральной Азии, а зимовал у берегов Средиземного моря и Ближнего Востока, перелетая тысячи километров между болотами и лагунами. Постепенно его следы становились все более редкими — последние достоверные наблюдения относятся к середине 1990-х годов. К 2024 году исчезновение считалось почти неизбежным, а в октябре 2025-го стало фактом. ([www.search.app](http://www.search.app))

По материалам, опубликованным в журнале *The Science of Nature*, суммарное количество насекомых, которое птицы съедают ежегодно, составляет примерно 500 млн тонн. Такие данные показывают: птицы — один из важнейших биологических "фильтров" природы. Без их участия численность многих насекомых выросла бы в разы, что привело бы к деградации лесов, снижению урожайности культур и нарушению пищевых цепочек. Чтобы оценить масштаб, учёные сравнили эти цифры с потреблением насекомых другими природными "хищниками". Так, по данным предыдущих исследований, пауки ежегодно поглощают от 400 до 800 млн тонн мелких беспозвоночных. Получается, птицы и пауки — два глобальных регулятора, которые совместно формируют экологическую устойчивость планеты. ([www.pravda.ru](http://www.pravda.ru))

Эксперты предупреждают: более половины видов птиц в мире сейчас находятся в стадии снижения численности. Согласно новому глобальному анализу Международного союза охраны природы (МСОП), 61 % оценённых видов демонстрируют тенденцию к уменьшению, тогда как девять лет назад такое явление фиксировалось у 44 % видов. Исследователи связывают ухудшение положения птиц с продолжающейся утратой среды обитания — леса и природные экосистемы уступают место сельскому хозяйству, инфраструктуре, росту городской территории. ([nia.eco/2025](http://nia.eco/2025))

### НОВАЯ КНИГА

К 100-летию первого в Казахстане и Средней Азии заповедника в электронном варианте вышла книга коллектива авторов «**Аксу-Джабаглы 100 лет**» (Алматы, 2025). Составитель и редактор – профессор А.Ф.Ковшарь. Книга иллюстрирована множеством фотографий, содержит описание природы, животного и растительного мира, истории создания, научных достижений и воспоминаний. Скачать её можно, открыв сайт журнала “Selevinia” ([www.selevinia.kz](http://www.selevinia.kz)).

### АНЕКДОТЫ

Лев собрал всех зверей и говорит: Сегодня будем есть самого трусливого. Заяц выбегает и орет:  
- Кабана в обиду не дам!

Только баран любит овцу за внешность, волк - за содержание!


Белка-летяга так за всю жизнь никуда и не слетала. Хотя планировала.

— Почему гуси всегда летят клином и один всегда впереди остальных?

— У него карта.

На Одесском привозе: — Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

— Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.



*И от расположения бывают отражения.*

---

**Внимание!** Все номера газеты «Remez» можно прочитать и скачать на сайте АСБК [www.acbk.kz](http://www.acbk.kz) Порядок доступа к электронному варианту газет «Remez» следующий: на Главной странице активируете «Зона данных», на странице Библиотека - «Журналы», на странице Журналы о природе – «Газета «Общества любителей птиц «Remez». (Надпись на выделенной зеленым полосе в нижней части страницы). Ссылка на весь список выпусков газеты: <http://www.acbk.kz/article/default/view?id=54> . На данную ссылку можно навести курсор, нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мышки. Сразу попадаете на страницу **Журналы о природе**.

**Газета «Remez» выходит с февраля 2005 года (с № 100 и в цветном варианте)**

\*\*\*\*\*

#### **Редакция:**

**В.В. Хроков**

(тел.373 36 60) Email: [vkh.remez@mail.ru](mailto:vkh.remez@mail.ru)

**В.Н Дворянов** (иллюстрации и дизайн)

(тел.230 42 30) [dvorianov36052@mail.ru](mailto:dvorianov36052@mail.ru)

Логотип ОЛП – Ф.Ф.Карпов

